

2026 年度 吉備国際大学

編入学（前期）試験問題

看護学部 看護学科

小論文（配当時間：60 分）

注）試験開始の合図があるまで開かないこと。
別紙解答用紙に記入すること。

2026 年度 看護学部 看護学科
編入学（前期）試験問題

近年、世界各地で地震や水害等の大規模災害が頻発し、本邦においても、地震や豪雨などの自然災害が多発しています。

災害発生時、被災者の生命と健康を守るために看護職に求められる役割は多岐にわたり、その役割は拡大しています。

このような現状において、「災害時に看護職が果たす役割」について、具体例を挙げながらあなたの考えを述べてください。

—別紙にて 600 字以内で述べなさい。—

2026 年度 吉備国際大学

編入学（前期）試験問題

看護学部 看護学科

専門科目（配当時間：60 分）

注）試験開始の合図があるまで開かないこと。
別紙解答用紙に記入すること。

各設問の解答番号を、解答用紙に記入しなさい。

I 基礎看護学

- 1 疾病や障害に対する一次予防は、疾病や障害の発生を未然に防ぐ行為である。疾病や障害に対する二次予防はどれか
 1. リハビリテーション
 2. 早期治療
 3. 予防接種
 4. 生活習慣の改善
- 2 面接時の質問で open - ended question 〈開かれた質問〉はどれか
 1. 「昨晚は眠れましたか」
 2. 「腹痛はありますか」
 3. 「朝食は食べましたか」
 4. 「退院後はどのように過ごしたいですか」
- 3 倫理原則の「善行」はどれか
 1. すべての人々に平等に医療を提供する
 2. 患者に利益をもたらす医療を提供する
 3. 患者に身体的損傷を与えない
 4. 患者が自己決定し選択した内容を尊重する
- 4 看護師の行動で適切なのはどれか
 1. 患者の氏名が記載された退院時看護サマリーを院外の研修の資料として配布した
 2. 受け持ち患者の情報を SNS に書き込んだ
 3. 患者の近隣の人から病状を聞かれたので答えられないと説明した
 4. 看護記録に謝りを見つけたので修正液を使って修正した
- 5 腋窩での体温測定について正しいのはどれか
 1. 麻痺のある患者では麻痺側で測定する
 2. 患者が側臥位になっている場合は上側で測定する
 3. 体温計の挿入角度は体軸に対し直角とする
 4. 食事が終了した直後に測定する

6 無菌操作を必要とするのはどれか

1. 胃内容物の吸引
2. 鼻腔吸引
3. 気管内吸引
4. 口腔内吸引

7 看護記録の内容で適切でないのはどれか

1. ケア後の看護師の感想
2. 患者の訴え
3. ケア中の患者の様子
4. 実施したケアの内容

8 患者と看護師が面談をする際、両者の信頼関係を構築するための看護師の行動で最も適切なのはどれか

1. 事前に用意した文章を読み上げる
2. 患者との視線の高さを合わせる
3. 面談した内容を電子カルテに入力することに集中する
4. 患者の正面に座る

9 鎖骨下静脈へ中心静脈カテーテルを挿入する際に起こりやすい合併症はどれか

1. 気胸
2. 誤嚥
3. 無気肺
4. 嗄声

10 夜間の睡眠を促す方法で適切なのはどれか

1. 夕食後にカフェインが多く含まれる飲み物を摂取する
2. 就寝前にお湯の温度 43℃で入浴をする
3. 朝、起床時に日光を浴びる
4. 就寝前に過ごす部屋の照明は 1000 ルクスがよい

II 成人看護学

1 壮年期の特徴はどれか

1. 骨密度の増加
2. 味覚の感度の向上
3. 早期覚醒による睡眠障害
4. 総合的判断力の向上

- 2 内臓の痛みを引き起こすのはどれか
 1. 虚血
 2. 氷水の摂取
 3. 平滑筋の弛緩
 4. 内視鏡によるポリープの切除

- 3 アドバンスケアプランニングの説明として適切なものはどれか
 1. 認知症に備えて事前に話し合うプロセス
 2. 余命半年と診断されてから話し合うプロセス
 3. 患者・家族・医療者がともに話し合う
 4. 変更する場合もあるので、記録しておかない方がよい

- 4 悪性中皮腫に関係する物質はどれか
 1. PM2.5
 2. フロン
 3. アスベスト
 4. ホルムアルデヒド

- 5 人工弁置換術の術後合併症で早期離床による予防効果が高いのはどれか
 1. 反回神経麻痺
 2. 術後出血
 3. 縦隔炎
 4. 肺炎

- 6 緩和ケアの説明で適切なものはどれか
 1. 入院が原則である
 2. 家族もケアの対象である
 3. 創の治癒を目的としている
 4. 患者の意識が混濁した時点から開始する

- 7 潰瘍性大腸炎の特徴で正しいのはどれか
 1. 遺伝性である
 2. 縦走潰瘍が特徴である
 3. 大腸がんの危険因子である
 4. 大量の水様性下痢が特徴である

8 キューブラー・ロスによる死にゆく人の心理過程で第3段階はどれか

1. 取り引き
2. 怒り
3. 否認
4. 抑うつ

9 胃底腺の主細胞の分泌物に由来する蛋白分解酵素はどれか

1. アミラーゼ
2. ペプシン
3. キモトリプシン
4. トリプシン

10 車軸関節はどれか

1. 腕尺関節
2. 上橈尺関節
3. 指節間関節
4. 胸鎖関節

Ⅲ 老年看護学

1 介護保険制度における都道府県が指定・監督を行う居宅サービスはどれか

1. 小規模多機能型居宅介護
2. 福祉用具貸与
3. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
4. 認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉

2 日本の将来推計人口で2025年の65歳以上の人口が総人口に占める割合に最も近いのはどれか

1. 5%
2. 7%
3. 30%
4. 55%

3 老化による尿の生成と排尿機能の変化はどれか

1. 排尿回数の減少
2. 膀胱容量の増加
3. 尿比重の上昇
4. 残尿量の増加

4 高齢者の看護において目標思考型思考を重視する理由で最も適切なのはどれか

1. 病態関連図の作成の効率化
2. 疾患の治癒促進
3. 加齢変化の進行を抑制
4. 生活全体を豊かにするケアの実践

5 関節拘縮の予防を目的とした関節可動域（ROM）訓練で正しいのはどれか

1. 他動運動は痛みが生じないように行う
2. 関節を速く動かす
3. 運動麻痺がある場合は患側から行う
4. 徒手筋力テストの結果が1の場合は自動運動を促す

IV 小児看護学

1 手足口病について誤っているものはどれか

1. エンテロウイルスなどが原因の冬場に流行する感染症である
2. 口腔粘膜や手足に水泡性の発疹が出るのが特徴である
3. 予防としては手洗いの徹底や排泄物の適正処理が重要となる
4. 重症化すれば髄膜炎などの神経合併症を起こすことがある

2 離乳の進行について誤っているものはどれか

1. 離乳初期（生後5～6か月頃）には口唇を閉じて捕食や嚥下ができるようになり、舌の前後運動で食物を咽頭の方に送って嚥下することを覚える
2. 離乳中期（生後7～8か月頃）には、舌でつぶせるかたさの食物を与える
3. 離乳開始時、食が進まず、鉄不足のリスクが高い場合はフォローアップミルクを使用する
4. はちみつは、乳児ボツリヌス症を引き起こすリスクがあるため、1歳を過ぎるまでは与えない

3 子どもの情緒や社会性の発達で正しいのはどれか

1. 快な刺激に対する反応は、不快な刺激に対する反応よりも早く分化する
2. 3歳頃には、大人とほぼ同じ情緒が一通り揃う
3. 嫉妬は2歳から出現する
4. 3歳頃から仲間との情緒的交流が始まる

4 あそびについて誤った組み合わせはどれか

1. 感覚遊び — メリーゴーランド
2. 受容遊び — 紙芝居
3. 構成遊び — ブランコ
4. 模倣遊び — ままごと

5 幼児の成長・発達について、誤っているものはどれか

1. 脳重量は5～6歳で成人の約90%に達する
2. 4歳では片足とびができるようになる
3. 2歳では自分で絵本のページをめくることができる
4. 2歳半頃には歯磨きやうがいができるようになる

V 母性看護学

1 30歳女性。2023年4月23日～4月30日まで月経があった。翌月、月経が見られず、6月7日産婦人科受診、結果エコーで妊娠が確認された。分娩予定日を求めよ

1. 2024年1月23日
2. 2024年1月30日
3. 2024年2月23日
4. 2024年2月30日

2 ハイリスク妊娠について正しいのはどれか

1. 多胎妊娠では過期産となりやすい
2. 妊娠糖尿病では低出生体重児となりやすい
3. 前置胎盤のリスクは妊娠中の喫煙量に比例する
4. 妊娠高血圧症候群（HDP）では胎児発育不全になりやすい

3 分娩の機序について答えよ。次の内容を時間経過順に正しく並べたのはどれか

1. 分娩開始→前駆陣痛→子宮口全開大→排臨→胎児娩出→胎盤娩出
2. 分娩開始→前駆陣痛→排臨→子宮口全開大→胎児娩出→胎盤娩出
3. 前駆陣痛→分娩開始→排臨→子宮口全開大→胎児娩出→胎盤娩出
4. 前駆陣痛→分娩開始→子宮口全開大→排臨→胎児娩出→胎盤娩出

4 産後うつ病について正しいものはどれか

1. 産褥10日頃から発症することが多い
2. 通常のうつ病と同様の症状があらわれる
3. 日本では産褥精神病の約半数を占める
4. エジンバラ産後うつ病自己評価票（EPDS）の8点以上が診断基準である

- 5 新生児の正常な子宮外適応現象として誤っているものはどれか
1. ヘモグロビンFの産生増加
 2. 肺でのガス交換の開始
 3. 卵円孔の閉鎖
 4. 動脈管の平滑筋の収縮

VI 精神看護学

- 1 統合失調症の陰性症状はどれか
1. 作為体験
 2. 感情鈍麻
 3. 滅裂思考
 4. 被害妄想
- 2 うつ病患者の看護で適切でないのはどれか
1. 自殺企図に注意する
 2. 便秘を予防する
 3. 身体の清潔を保つ
 4. 機会あるごとに励ます
- 3 認知行動療法で最も期待されている効果はどれか
1. 過去の心的外傷に気づく
 2. 薬物療法についての理解が深まる
 3. 物事に対する誤った信念が修正される
 4. 人間の生きる意味を感じとることができる
- 4 保健医療従事者に現れやすいのはどれか
1. 同一性拡散症候群
 2. 緊張病症候群
 3. 燃えつき症候群
 4. 空の巣症候群
- 5 医療者に対して強い怒りを頻回にぶつける患者に対して、医療者が感じる可能性があるのはどれか
1. 退行
 2. 陰性感情
 3. 合理化
 4. 反動形成

VII 在宅看護学

1 訪問看護事業所で正しいのはどれか

1. 24 時間対応が義務付けられている
2. 自宅以外への訪問看護は認められない
3. 特定非営利活動法人（NPO）は事業所を開設できる
4. 従事する看護師は臨床経験 3 年以上と定められている

2 介護保険における被保険者の要支援状態に関する保険給付はどれか

1. 医療給付
2. 介護給付
3. 年金給付
4. 予防給付

3 介護保険制度における施設サービスはどれか

1. 介護医療院サービス
2. 小規模多機能型居宅介護
3. サービス付き高齢者向け住宅
4. 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）

4 A さん（87 歳、男性）。3 年前に Alzheimer（アルツハイマー）型認知症と診断された。1 年前に妻が亡くなってから 1 人で暮らしている。日常生活は問題なく送れていたが、最近 A さんは薬を飲み忘れることが増えてきたり、電話の対応ができなかったりすることがあり、日常生活に支障が出るようになった。A さんの状態に該当する認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランクはどれか

1. ランクⅡa
2. ランクⅡb
3. ランクⅢa
4. ランクⅢb
5. ランク M

5 特別訪問看護指示書による訪問看護について正しいのはどれか

1. 提供できる頻度は週に 3 回までである
2. 提供できる期間は最大 6 か月である
3. 対象に指定難病は含まない
4. 医療保険が適用される

VIII 統合看護

- 1 災害拠点病院の説明で正しいのはどれか
 1. 国が指定する
 2. 災害発生時に指定される
 3. 広域搬送の体制を整えている
 4. 地域拠点病院は各都道府県に1か所設置される
- 2 医療法における病院の医療安全管理体制で正しいのはどれか
 1. 医療安全管理のために必要な研修を2年に1回行わなければならない
 2. 医療安全管理のための指針を整備しなければならない
 3. 特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい
 4. 医薬品安全管理者の配置は義務ではない
- 3 診療情報の取扱いで適切なのはどれか
 1. 診療情報の開示請求は患者本人に限られる
 2. 医療者は患者が情報提供を受けることを拒んでも説明する
 3. 2類感染症の届出は患者本人の同意を得なければならない
 4. 他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報を提供する
- 4 病床機能報告について正しいのはどれか。
 1. 各医療機関の管理者が厚生労働省に報告する
 2. 一般病床、療養病床を有する病院のみ報告義務がある
 3. 労働基準法に基づいて実施される
 4. 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる病床は慢性期機能に分類される
- 5 病棟で患者の口腔ケア改善に取り組むために担当チームを作ったこれは看護管理のプロセスのどれか
 1. 計画
 2. 指揮
 3. 統制
 4. 組織化

2026 年度 吉備国際大学

編入学（後期）試験問題

看護学部 看護学科

小論文（配当時間：60 分）

注）試験開始の合図があるまで開かないこと。
別紙解答用紙に記入すること。

2026 年度 看護学部 看護学科
編入学（後期）試験問題

看護職には、日本看護協会の「看護職の倫理綱領」に基づく、高い責任感と専門的な役割が求められている。複雑化する医療現場において、生じる倫理的課題を適切に認識し、倫理的介入を実践するためには、看護職自らが「倫理的感性」を高めることが不可欠である。

以上のことを踏まえ、看護実践における「倫理的感性」を高めるための方略について、あなたの見解を 600 字以内で記述してください。

2026 年度 吉備国際大学

編入学（後期）試験問題

看護学部 看護学科

専門科目（配当時間：60 分）

注）試験開始の合図があるまで開かないこと。
別紙解答用紙に記入すること。

各設問の解答番号を、解答用紙に記入しなさい。

I 基礎看護学

1. QOL を評価する項目で最も重要なのはどれか。
 1. 生存期間
 2. 本人の満足感
 3. 高度医療を受けられたか
 4. 社会への貢献

2. 終末期に自分がどのような医療を受けたいかをあらかじめ文書で示しておくのはどれか。
 1. リビングウィル
 2. インフォームド・コンセント
 3. アドボカシー
 4. アドヒアランス

3. 世界保健機構（WHO）が定義する健康について間違いはどれか。
 1. 国家に頼らず個人の努力で獲得するものである
 2. 肉体的・精神的及び社会的に満たされた状態である
 3. 地域や文化的背景の影響を受ける
 4. 単に疾病または病弱の存在しないことだけではない

4. 上腕からの出血時、間接的止血の部位はどれか。
 1. 総頸動脈
 2. 橈骨動脈
 3. 肘正中皮静脈
 4. 腋窩動脈

5. 1 回の気管内吸引を 30 秒以上実施した場合に生じるのはどれか。
 1. 呼吸停止
 2. 低酸素血症
 3. 嘔吐
 4. 心肺停止

6. 努責やくしゃみをしたときに生じる尿失禁はどれか。
 1. 反射性尿失禁
 2. 切迫性尿失禁
 3. 腹圧性尿失禁
 4. 機能性尿失禁

7. 意識障害がある患者への救命救急処置で最も優先されるのはどれか。
1. 名前を呼び刺激を与える
 2. 輸液
 3. 気道確保
 4. 胸骨圧迫
8. 鎖骨下静脈へ中心静脈カテーテルを挿入する際に起こりやすい合併症はどれか。
1. 嘔声
 2. 無気肺
 3. 肺炎
 4. 気胸
9. 個人防護具の脱衣手順で最初に外すのはどれか。
1. ガウン
 2. サージカルマスク
 3. フェイスシールド
 4. 手袋
10. 疾病や障害に対する二次予防はどれか。
1. 早期治療
 2. 早期リハビリテーション
 3. 予防接種
 4. 生活リズムの改善

II 成人看護学

1. 2023年度の悪性新生物の死亡率において、女性の部位別第一位はどれか。
1. 乳がん
 2. 気管、気管支および肺
 3. 胃
 4. 大腸
2. 生活習慣が発症に関連している疾患はどれか。
1. 肺気腫
 2. I型糖尿病
 3. 肥大型心筋症
 4. 重症筋無力症

3. ヒト免疫不全ウイルス（HIV）に感染している患者で後天性免疫不全症候群（AIDS）の状態にあると判断できる疾患はどれか。
1. ノロウイルス性腸炎
 2. ニューモシスチス肺炎
 3. 季節性インフルエンザ
 4. 単純性膀胱炎
4. エストロゲン低下によって更年期の女性におこるのはどれか。
1. 骨量の低下
 2. 内臓脂肪の減少
 3. 脳血流量の増加
 4. HDL コレステロールの上昇
5. 脳梗塞を最も早期に検出できる画像検査はどれか。
1. シンチグラフィ
 2. 磁気共鳴画像（MRI）
 3. 磁気共鳴血管画像（MRA）
 4. コンピュータ断層撮影（CT）
6. 慢性心不全患者の生活指導で、心臓への負担を少なくするのはどれか。
1. インフルエンザワクチン接種の回避
 2. タンパク質を制限した食事
 3. 食直後の入浴
 4. 排泄後の休息
7. 手術後に無排卵となるのはどれか。
1. 脳下垂体全摘出術
 2. 単純子宮全摘術
 3. 低位前方切除術
 4. 片側卵巣切除術
8. タイムアウトによって予防できるのはどれか。
1. 個人情報漏洩
 2. 患者の誤認
 3. ベッドからの転落
 4. 血液感染

9. 小細胞がんで正しいのはどれか。

1. 患者数は非小細胞がんより多い
2. 肺末梢側に発生しやすい
3. 悪性度の低いがんである
4. 治療はがん薬物療法を行う

10. 後天性の大動脈弁狭窄症について正しいのはどれか。

1. 二尖弁が多い
2. 弁尖の石灰化による
3. 左室壁は徐々に薄くなる
4. 拡張期に心雑音を聴取する

Ⅲ 老年看護学

次の設問の解答の番号を、解答用紙に記入しなさい。

1. 現在の日本の終末期医療において、患者の将来の自己決定能力の低下に備えて、患者・家族と医療者が今後の治療・療養についての気付きや価値観を定期的に話し合っ共有し、患者の意向に沿った医療を提供することが望ましいとされている。この内容を示すのはどれか。

1. アドバンスディレクティブ〈事前指示〉の支援
2. 代理意思決定の支援
3. アドバンス・ケア・プランニング
4. ダイバーシティ

2. 成年後見制度で正しいのはどれか。

1. 法定後見制度とは判断能力の低下に備えあらかじめ後見人を決めておくことである。
2. 後見の対象者は大体のことを自分で判断できる者である。
3. 審判を受けるための申し立て先は社会福祉協議会である。
4. 地域生活支援事業の1つとして位置付けられる。

3. 令和3年度(2021年度)の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査で、養介護施設従事者等による高齢者虐待について正しいのはどれか。

1. 虐待の種類は心理的虐待が最も多い。
2. 発生要因は養介護施設従事者等のストレスの問題が最も多い。
3. 被虐待高齢者は女性が全体の40%を占める。
4. 虐待件数は養介護施設従事者等による虐待より養護者によるものが多い。

4. 地域包括支援センターの主な業務に含まれるのはどれか。

1. 介護予防ケアマネジメント
2. 特定健康診査・特定保健指導
3. 予防接種法に基づく予防接種
4. 要介護認定調査

5. 認知症施策推進総合戦略の7つの柱に含まれないものはどれか。

1. 認知症の人の介護者への支援
2. 認知症対応型共同生活介護サービスの創設
3. 若年性認知症施策の強化
4. 認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進

IV 小児看護学

1. スキャモンの発達曲線において、学童期（6～12歳）に成人のレベルを大きく超えて（約200%近くまで）発達のピークを迎えるのはどれか。

1. 神経系（脳・脊髄など）
2. 全身（身長・体重など）
3. リンパ系（胸腺・扁桃など）
4. 生殖器系（性器など）

2. 離乳食でアレルギーの原因となりやすい「特定原材料7品目（2023年3月改正以降、8品目）」に含まれ、特に離乳食で注意が必要な食品の組み合わせとして、適切なものはどれか。

1. さけ、さば
2. 大豆、ごま
3. りんご、もも
4. 卵、小麦、乳製品

3. あそびについて誤った組み合わせはどれか。

1. 感覚運動遊び — 水遊び
2. 受容遊び — DVDを見る
3. 構成遊び — ブランコ
4. 象徴遊び — 仮面ライダーごっこ

4. インスリン療法中の子どもの栄養管理は、成長発達途上にもあるため重要となる。食事管理で用いられる「カーボカウント」に関する説明として、最も適切なのはどれか。
1. 炭水化物を多く含む食品（主食など）の摂取を厳しく制限し、血糖変動を抑える方法である。
 2. 1日に摂取する総カロリーを厳密に計算し、インスリン量を決定する方法である。
 3. 食事に含まれる脂質とタンパク質の量を計算し、持効型インスリンの量を調整する方法である。
 4. 食事に含まれる炭水化物（糖質）の量を把握し、それに見合った食前の超速効型インスリンの量を決定する方法である。
5. チアノーゼ型心疾患（例：ファロー四徴症）を持つ幼児が、遊びの途中でしゃがみ込む「蹲踞（そんきょ）」の姿勢をとることがある。この行動の理由として最も適切なのはどれか。
1. 下肢の筋肉痛を和らげるため。
 2. 腹圧をかけて排便を促すため
 3. 体血管抵抗を上げて右 - 左短絡を減少させるため
 4. 家族や友人の注意を引くため

V 母性看護学

1. 妊娠初期の生理的変化について正しいものはどれか。
1. 基礎体温は低温相を示す。
 2. 子宮は骨盤腔内にとどまり、大きさはほとんど変化しない。
 3. 循環血液量は減少し、血中ヘモグロビン濃度は上昇する。
 4. 循環血漿量が増加し、見かけ上の貧血がみられる。
2. 胎児心拍数（FHR）モニタリングについて正しいものはどれか。
1. 基線細変動が消失している場合は、胎児の覚醒期を示す。
 2. 遅発一過性徐脈は、胎児低酸素の兆候として注意が必要である。
 3. 早発一過性徐脈は、胎児の臍帯圧迫を示す。
 4. 遷延一過性徐脈は、胎児の臍帯圧迫を示す。
3. 分娩第1期に関する説明で正しいものはどれか。
1. 陣痛が始まり、子宮口が全開大になるまでの期間である。
 2. 子宮口が全開大になった後、胎児が娩出されるまでの期間である。
 3. 胎盤が娩出されるまでの期間である。
 4. 胎児の下降がみられず、痛みは不規則である。
4. 産褥期の身体的変化について正しいものはどれか。
1. 子宮底は分娩直後に臍下2～3横指まで収縮し、分娩後12時間では臍高付近にある。
 2. 悪露は赤色から黄色、白色へと変化し、約3か月で消失する。
 3. 乳汁分泌はエストロゲンの作用で促進される。
 4. 褥婦の血液凝固能は低下し、出血傾向が強まる。

5. 新生児の生理的現象として正しいものはどれか。

- a. 生後 3 日目に皮膚が淡黄色を呈し、1 週間後には消失した。
- b. 生後 12 時間で直腸温が 35.2℃に低下し、その後も 36℃未満で推移している。
- c. 生後 5 日目に体重が出生時より 12%減少した。
- d. 生後 2 週目から乳児脂漏性皮膚炎が出現した。
- e. 生後 2 日目に少量の血性膣分泌物を認めた。

- 1. a, e
- 2. a, d
- 3. b, c
- 4. d, e

VI 精神看護学

1. 統合失調症について正しいのはどれか。

- 1. 幻覚のなかでは幻視が最もよくみられる。
- 2. 感情鈍麻は陽性症状である。
- 3. 思春期から 30 歳ごろまでに発症することが多い。
- 4. 統合失調症の入院患者は精神科病棟のなかで最も少ない。

2. 典型的なうつ病の症状がどれか。

- 1. 幻聴
- 2. 感情失禁
- 3. 理由のない爽快感
- 4. 興味と喜びの喪失

3. 認知行動療法で最も期待されている効果はどれか。

- 1. 過去の心的外傷に気づく
- 2. 薬物療法についての理解が深まる
- 3. 物事に対する誤った信念が修正される
- 4. 人間の生きる意味を感じとることができる

4. 神経性食欲不振症の症状または所見はどれか。

- 1. 発熱
- 2. 咳嗽
- 3. 徐脈
- 4. 過多月経

5. 医療者に対して強い怒りを頻回にぶつける患者に対して、医療者が感じることがあるのはどれか。
1. 退行
 2. 陰性感情
 3. 合理化
 4. 反動形成

VII 在宅看護学

1. 訪問看護サービスの提供の仕組みで正しいのはどれか。
 1. 主治医の意見書が必要である。
 2. 計画外の緊急訪問の費用は徴収できない。
 3. サービスの導入の決定は訪問看護師が行う。
 4. 主治医の特別指示書による訪問看護は医療保険サービスとして提供する。
2. Aさん（85歳、女性）は1人暮らし。うつ血性心不全で臥床して過ごすことが多い。訪問看護師が訪問すると、Aさんは体温 37.6℃、口唇の乾燥はなく、体熱感はあるが手足が冷えると言って羽毛布団を肩まで掛けられている。室温 30℃、湿度 65%、外気温は 32℃、冷房設備はあるが使っていない。このときの訪問看護師の対応で適切なのはどれか。
 1. 羽毛布団を取り除く。
 2. 冷房設備で室温を調整する。
 3. 頓用の解熱薬を服用してもらう。
 4. 直ちに経口補水液を飲むよう促す。
3. 要介護認定者であっても、訪問看護が医療保険で提供される疾患はどれか。
 1. 糖尿病
 2. 認知症
 3. 脳梗塞
 4. 多発性硬化症
4. 介護保険法施行令において特定疾病に指定されているのはどれか。
 1. 脊髄損傷
 2. Crohn（クローン）病
 3. 脳血管疾患
 4. 大腿骨頸部骨折
5. 地域包括ケアシステムにおける支援のあり方で、「互助」を示すのはどれか。
 1. 高齢者が生活保護を受けること
 2. 住民が定期的に体重測定すること
 3. 要介護者が介護保険サービスを利用すること
 4. 住民ボランティアが要支援者の家のごみを出すこと

VIII 統合看護

1. 日本における政府開発援助<ODA>の実施機関として正しいのはどれか。
 1. 国際協力機構 (JICA)
 2. 世界保健機関 (WHO)
 3. 国際児童基金 (UNICEF)
 4. 国連世界食糧計画 (WFP)

2. 患者とのコミュニケーションで適切なのはどれか。
 1. 否定的感情の表出を受け止める。
 2. 沈黙が生じた直後に会話を終える。
 3. 看護師が伝えたいことに重点をおく。
 4. 患者の表情よりも言語による表現を重視する。

3. 災害時に最も優先して治療を行うのはどれか。
 1. 脱臼
 2. 気道熱傷
 3. 足関節捻挫
 4. 過換気症候群

4. 機能別看護方式の説明で正しいのはどれか。
 1. 勤務帯ごとに各看護師が担当する患者を決めて受け持つ。
 2. 内容別に分類した看護業務を複数の看護師が分担して実施する。
 3. 1人の看護師が1人の患者を入院から退院まで継続して受け持つ。
 4. 患者を複数のグループに分け、各グループを専属の看護師チームが受け持つ。

5. 看護におけるクリニカルラダーについて正しいのはどれか。
 1. 病院に導入が義務付けられている。
 2. ワーク・ライフ・バランスを目指すものである。
 3. 臨床実践に必要な能力が段階的に表現されている。
 4. 全国の病院で共通のクリニカルラダーが使用されている。